Guide du jardinier 2022

Fertilisation bio s.v.p.!

Chaque année, avant la plantation ou le semis assurez-vous que le sol est bien meuble en profondeur et apportez la bonne quantité de compost. Si le sol est compacté, les racines de vos plants ne pourront pas se développer et se nourrir normalement.

Apportez aussi du compost annuellement à votre jardin pour nourrir votre sol en y ajoutant de la matière organique. Celui-ci permettra un apport prolongé en éléments nutritifs tout en participant à améliorer la qualité des sols à long terme.

Vous pourrez ensuite apporter un peu de fumier de poulet granulé selon le besoin des cultures à raison de :

Peu gourmande : 60g/m2

Gourmande : 100g/m2

Très gourmande : 150g/m2

Pour les cultures de longue durée (tomate, aubergine, poivron, cerise de terre), on peut répéter l'apport de fumier granulé à toutes les 3-4 semaines ou si des signes de carences apparaissent (attention la carence peut aussi être causée par un pH du sol inadéquat, un manque ou un surplus d'eau souvent causé par un sol mal drainé).

Désherbage

Gardez le contrôle!

Essayer de désherber des l'apparition des mauvaises herbes. Elles seront beaucoup plus facile à détruire. Des l'apparition des mauvaises herbes, brasser la terre avec un outil sur environ 2 cm de profondeur lors d'une journées ensoleillé, les petite racines des mauvaises herbes vont sécher au soleil et elles ne reviendront pas.

Les tomates

Les tomates sont qualifiées de déterminées ou indéterminées. Ces termes font référence au port du plant.



Les plants de tomates au port déterminé (dét.) ont généralement une forme buissonnante et compacte. Elles produiront un nombre de grappes et de feuilles déterminées. Elles ne demandent ni taille ni tuteur. On peut toutefois les cultiver à l'intérieur d'une cage à tomates afin de permettre une meilleure aération. Leurs récoltes sont abondantes, mais brèves.

Les plants de tomates au port indéterminé (ind.) pousseraient à l'infini si ce n'était des maladies foliaires et du gel. Ils produiront une première grappe vers la onzième feuille puis 3 feuilles suivi d'une grappe et ainsi de suite. Ils exigent un tuteur solide et une taille des drageons (ou gourmands). La production est supérieure à celle des tomates à port déterminé et s'étale sur une période plus longue. Habituellement, les variétés indéterminées sont les plus tardives. Afin d'assurer une meilleure production pour les plants au port indéterminé, il est important de supprimer les gourmands. Différentes niveaux d'intervention son possibles.

-Pour une taille minimale, on conserve le drageon vigoureux situé sous la 1re grappe florale et on enlève ceux situés plus bas jusqu'à la base du plant. Ensuite, on tuteure les tiges au fur et à mesure qu'elles poussent.

- Pour une taille en continue, on conserve seulement le drageon vigoureux situé sous la 1re grappe florale qui deviendra la 2e tige du plant. Tous les autres drageons qui poussent à l'aisselle des feuilles sont enlevés . Cette taille favorise des fruits plus gros et plus tôt en saison. On tuteure les tiges au fur et à mesure qu'elles poussent.

espacement et fertilisation

légume	distance entre les plants	fertilisation
thym	15 cm	faible
origan	15 cm	faible
ciboulette	15 cm	moyenne
oignon	25 cm (en groupe de 3 ou 4)	moyenne
oignon vert	10 cm (en groupe de 10)	moyenne
poivron	30 cm	élevée
aubergine	30 cm	élevée
cerise de terre	60 cm	élevée
persil	25 cm	faible
tomate	45 cm	élevée
tomate cerise	45 cm	élevée
basilic	25 cm	moyenne
bette à carde	25 cm	moyenne
kale	30 à 45 cm	moyenne
laitue	30 cm	faible
chou rave	20 cm	moyenne
coriandre	15 cm (en groupe de 10)	faible
concombre	45 cm	élevée
courge	90 cm	élevée
courgette	60 cm	élevée
melon	60 cm	élevée

fertilisation (fumier de poule bio 4-3-2)
faible : 60g/m2
moyenne : 100g/m2
élevée : 150g/m2

Nous vous conseillons aussi d'appliquer environ 2cm (4 litres/m2) de compost annuellement sur vos surfaces cultivés